

Antiséptico
para la piel sana

Antiseptic
for healthy skin

Anti-séptico
para a pele saudável



para manos / para mãos

Bacterigel G-3

ES Bacterigel G-3 Clorexidina 0.5% alcohólica incolor. Indicado para la antisepsia quirúrgica de manos y antiséptico para frotado higiénico de piel sana.

COMPOSICIÓN: 2.5g de Clorexidina de Digluconato al 20%, Etanol 70%, Excipientes y agua c.s.p 100%. **INSTRUCCIONES DE USO:** Antiséptico quirúrgico de manos por fricción: Aplicar el producto puro (3 ml) siempre sobre la piel sana, limpia y seca, extendiéndolo sobre toda la superficie de las manos, friccionando bien entre los dedos, y antebrazos durante 3 minutos. Dejar secar o ayudarse de una toalla estéril. Antiséptico higiénico de manos por fricción: Aplicar el producto puro (5 ml) siempre sobre la piel sana, limpia y seca, friccionando sobre la piel durante 30 segundos. Dejar secar o ayudarse de una toalla estéril. Antiséptico de uso externo. No ingerir. No inhalar. Leer la etiqueta antes del uso y, a fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando su liberación al medio ambiente. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. No mezclar con otros productos. **RECOMENDACIONES IMPORTANTES:** Indicaciones de peligro: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Consejos de prudencia: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con ojos, mucosas y zonas sensibles y enfermas de la piel. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Conservar únicamente en el recipiente original. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. Conservar en un lugar fresco. No exponer a temperaturas superiores a 30 °C. Proteger de la luz del sol. Eliminar el contenido o el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. EN CASO DE exposición o malestar llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915620420) o a un médico. Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Nº Reg. AEMPS: 633-DES. Nº Reg. Fabricante: 463 DS. Lote, fecha de fabricación y de caducidad: ver dato impreso.

EN Alcohol solution based on 0.5% chlorhexidine indicated as a pre-surgical antiseptic and hygienic rubbed skin antiseptic.

COMPOSITION: 2.5g of 20% Digluconate Chlorhexidine, 70% Ethanol, Excipients and water e.q.f 100%. **INSTRUCTIONS FOR USE:** Pre-surgical friction hands antiseptic: Apply the product pure (3 minutes) always on healthy, clean and dry skin extending over the entire surface of the hands, rubbing well between the fingers and forearms for 3 minutes. Let dry or help with a sterile towel. Hygienic hand antiseptic by friction: Always apply the product pure (5ml) on healthy, clean and dry skin, rubbing on the skin for 30 seconds. Let dry or help with a sterile towel. Antiseptic for external use. Do not swallow. Read the label before use and in order to avoid risks to people and the environment, follow the instructions for use. It must be disposed of correctly, avoiding its release to the environment. Do not use in people sensitive to its components, or in large areas of the skin, or for a long time, or with non-breathable tissues. May cause skin or allergic reactions. The product should only be used under optional prescription in children under 30 months. The use of alcoholic or aqueous based chlorhexidine skin solutions, as a skin disinfectant, has been associated with chemical burns in neonates. Do not mix with other products. **IMPORTANT RECOMMENDATIONS:** Hazard Indications: Harmful to aquatic organisms, with lasting harmful effects. Highly flammable liquid and vapor. Causes serious eye irritation. Precautionary statements: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if worn and easy. Continue rinsing. Keep out of the reach of children. Avoid contact with eyes, mucous membranes and sensitive and diseased areas of the skin. Keep container tightly closed. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and any other source of ignition. No Smoking. Keep only in the original container. If eye irritation persists: consult a doctor. Store in a well ventilated place. Keep in a cool place. Dispose of the contents or the container in accordance with the regulations on hazardous waste. In case of exposure or discomfort, immediately call a TOXICOLOGICAL INFORMATION CENTER or your doctor. If you need medical advice, have the container or label handy. Nº Reg Manufacturer 463.DS. Batch, date of manufacture and expiration date: see printed data

PT Bacterigel G-3 Clorexidina 0.5% alcohólica incolor. Indicado para antisepsia cirúrgica das mãos e anti-séptico para esfregado higiénico da pele saudável.

COMPOSIÇÃO: 2.5g de Clorexidina Digluconato de 20%, Etanol a 70%, Excipientes e água q.s.p 100%. **INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:** Antiséptico cirúrgico das mãos para fricção: Aplique o produto puro (3 ml) sempre sobre a pele saudável, limpa e seca, a espalhar por toda a superfície das mãos e a esfregar bem entre os dedos e antebraços por 3 minutos. Deixe secar ou ajude com uma toalha estéril. Anti-sepsia higiénica para lavagem das mãos por fricção: Aplique o produto puro (5 ml) sempre na pele saudável, limpa e seca, a esfregar na pele por 30 segundos. Deixe secar ou ajude com uma toalha estéril. Uso anti-séptico externo Não ingerir. Não inalar. Leia o rótulo antes de usar e, a fim de evitar riscos para pessoas e meio ambiente, siga as instruções de uso. Eliminar o conteúdo / recipiente de a evitar sua liberação para o meio ambiente. Não pode ser usado em pessoas que são sensíveis aos seus componentes, em extensas áreas da pele, ou durante muito tempo, nem com tecidos não respiráveis. Pode causar reações alérgicas ou à pele. o produto deve ser usado sob prescrição em crianças menores de 30 meses. O uso de soluções de clorexidina para a pele de base alcohólica ou aquosa, como desinfetante da pele, tem sido associada a queimaduras químicas em neonatos. Não misture com outros produtos. **RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:** Indicações de perigo: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Provoca irritação ocular grave. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Manter fora do alcance das crianças. Evite o contacto com os olhos, mucosas e áreas sensíveis e doentes da pele. Manter o recipiente herméticamente fechado. Manter afastado do calor, superfícies quentes, fumaça, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Manter unicamente no recipiente original. Se a irritação nos olhos persistir: consulte um médico. Armazenar em local bem ventilado. Não expor a temperaturas acima de 30°C. Proteger da luz solar. Eliminar o conteúdo / recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. Em caso de exposição ou desconforto ligue para um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (Serviço Nacional de Informações sobre Toxicologia) (Tel: 800 250 250) ou um médico. Se você precisar de orientação médica, Tenha o recipiente ou etiqueta à mão.

Nº Reg. Fabricante: 463 DS.

Lote, fecha de fabricação e caducidad: Ver dados impressos

By



LABORATORIOS
BILPER® Group
www.bilper.com

500ml.

Uso
externo



Peligro

